


COVID-19AREN HILKORTASUNA NO2 KONTZENTRAZIOAREKIKO

Posted on 27/04/2020 by Naider

PORCENTAJE DE MUERTES POR COVID-19 EN RELACIÓN A LA CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO₂) EN REGIONES DE ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA Y ALEMANIA

Fuente: Yaron Ogen ([publicado el 15 Julio 2020 en Science of the Total Environment](#))



Orain arte, airearen kutsadura COVID-19aren ondoriozko heriotza-tasa handitzearekin lotzen zuten datuak mugatuak ziren.

Hala ere, azken ikerketa batek COVID-19-ren ondoriozko heriotzen ehunekoa Espainia, Italia, Frantzia eta Alemaniako hainbat eskualdetan nitrogeno dioxidoaren kontzentrazioan oinarrituta erakutsi du. Azterketak agerian uzten du COVID-19aren ondorioz heriotzen % 78 nitrogeno dioxidoaren kutsadura handia duten eskualdeetan gertatu dela, eta kutsatzaile horren kontzentrazio oso baxua duten eskualdeetan, berriz, ez da ia COVID-19aren heriotzarik ikusten.

Hori ulertzeko, jakin behar da nitrogeno dioxidoak (NO₂), batez ere motordun ibilgailuen errekuntzak eta zentral elektrikoetan igortzen dituenak, pertsonen arnasbideei kalte egiten diela. Yaron Ogen doktoreak, ikerketaren egileak, justifikatu duenez, "koronavirus berriak arnasbideetan ere eragiten duenez, arrazoizkoa da pentsatzea airearen kutsaduraren eta COVID-19aren ondorioz hildakoen kopuruaren arteko korrelazioa egon daitekeela". p >

There are no comments yet.